

# Blood Culture Bottle - A (체외진단 의료기기)

## ● 사용목적

각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택·동정 배지, 혈액 배양 배지

## ● 사용방법

### (1) 검사 원리

호기성과 통성혐기성 세균 배양용 배지, 혈액배양용으로 쓰인다. 텍스트로스(Dextrose)를 넣을 경우 미생물의 더 활발한 성장을 보인다.

### (2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

1) 검체는 감염이 있는 바로 그 부위에서 채취해야 하며 인접부위에서 오염 균이 들어가는 것을 막아야 한다.

### (3) 검사 전 준비과정

1) 무균처리한 적당한 검체의 채취기구와 용기를 준비한다.

### (4) 검사과정

- 1) 접종 시 무균인 곳(예. 클린벤치)에서 멸균된 채취 기구를 사용하여 검체를 채취한다.
- 2) 채취한 검체를 Blood Culture Bottle A 배지에 접종한다.
- 3) 35°C 인큐베이터 안에서 7일 배양 후 결과를 판독한다.  
(Brucella의 경우 표준 방침에 따라 더 오래 배양)

### (5) 결과판정

- 1) 균이 자랐는지 확인 후, 그 균이 어떤 균 인지 확인한다.
- 2) 판정기준

명칭	ATCC	성적
<i>S. pneumoniae</i>	6305	Growth
<i>P. aeruginosa</i>	27853	Growth

## ● 정도관리

### 1) 사용할 균주

*S. pneumoniae* ATCC 6305  
*P. aeruginosa* ATCC 27853

### 2) 사용할 배지

Blood Culture Bottle A배지를 냉장고에서 꺼내 Clean Bench에 30분 정도 준비 한다.

### 3) 접종균액의 준비

표준균주 균집락을 채취하여 Mueller Hinton Broth 에 풀어 탁도 0.5 McFarland에 맞춘다.

### 4) 시험 과정

탁도를 맞춘 균액을 10 $\mu$ l 채취한 후 Blood Culture Bottle A 배지에 접종 한다. 접종 후 , 35°C Incubator에서 5일 배양 후 결과를 확인 한다.

## ● 보관조건 및 사용기한

개봉여부	보관조건	사용기한
미개봉	냉장(2-10°C)	제조 후 6개월

## ● 원재료(성분 또는 특징)

Pancreatic Digest of Casein	17 g
Papaic Digest of Soybean	3 g
Sodium Chloride	5 g
Dibasic potassium Phosphate	2.5 g
Dextrose	2.5 g
Polyanetholesulfonic acid	0.25 g

## ● 사용상의 주의사항 및 폐기 방법

1. 본 제품은 의료기기이며, 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 제품은 반드시 냉장 보관 (2~10°C) 해 주십시오.
3. 사용시간이 경과한 제품이나 동결되었던 제품은 품질이 변질되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 사용시 오염 가능성이 없는 곳에서 사용해 주십시오.  
(예. 클린벤치)
5. 검체는 병원성 미생물일 가능성이 있으므로 취급시 주의하여 주십시오.
6. **사용 후 폐배지는 멸균 한 후 의료 폐기물 또는 산업 폐기물 등으로 구분하여 처리 해 주십시오.**
7. 측정결과에 기초한 진단은 다른 검사 결과 등과 종합하여 담당 의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.
8. **본 제품은 일회용이므로 재사용하지 하지 마십시오.**

## ● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2013년11월08일      개정연월일 : 2024년06월18일

## ● 포장규격(시약 구성내용)

20mL × 10 / 1kit  
45mL × 10 / 1kit

## ● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.  
연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750